

## Program běžného očkování u dětí

Jednotlivé očkování se podává jedinou injekcí do svalů dolní končetiny nebo horní paže dítěte.

V kolika letech očkovat	Ochrana proti onemocněním	Podávané očkování
<b>Dva měsíce</b>	záškrty, tetanus, černý kašel (dávivý kašel), dětská obrna a hemofilní chřipka typu b (Hib) pneumokokální infekce	DTaP/IPV/Hib a pneumokokální konjugční vakcína PKV (PCV)
<b>Tři měsíce</b>	záškrty, tetanus, černý kašel, dětská obrna a DTaP/IPV/Hib a hemofilní chřipka typu b (Hib) zápal mozkových blan C (meningokokální skupina C)	MenC
<b>Čtyři měsíce</b>	záškrty, tetanus, černý kašel, dětská obrna a DTaP/IPV/Hib, hemofilní chřipka typu b (Hib) zápal mozkových blan C pneumokokální infekce	MenC a PKV (PCV)
<b>Kolem 12. měsíců</b>	hemofilní chřipka typu b (Hib) a zápal mozkových blan C	Hib/MenC
<b>Kolem 13. měsíců</b>	spalničky, příušnice a zarděnky (německé spalničky) pneumokokální infekce	SPZ (MMR) a PKV (PCV)
<b>Tři roky a čtyři měsíce nebo brzy poté</b>	záškrty, tetanus, černý kašel a dětská obrna spalničky, příušnice a zarděnky	DTaP/IPV nebo dTaP/IPV a SPZ (MMR)
<b>Děvčata ve věku od 12. do 13. let</b>	rakovina děložního krčku způsobená epitelovým virem typu 16 a 18	HPV
<b>13 až 18 let</b>	Tetanus, záškrty a dětská obrna	Td/IPV

### Očkování, které se běžně neprovádí u dětí, které jsou vystaveny rizikům

V kolika letech očkovat	Ochrana proti onemocněním	Podávané očkování
<b>Při narození (dětem, které přijdou)</b>	Tuberkulóza	BCG

pravděpodobněji do kontaktu  
s TB než zbytek běžné  
populace)

**Při narození** Hepatitis B  
(dětmi, které mají matku nositelku žloutenky typu B)

Hep B