

Polish

Program planowych szczepień ochronnych dla dzieci

Każde szczepienie jest podawane w formie pojedynczego zastrzyku domięśniowego w udo lub górną część ramienia.

Wiek szczepienia	Choroby przeciwko którym chroni szczepienie	Podana szczepionka
Dwa miesiące	Błonica, tężec, krztusiec, polio oraz pałeczki grypy typu b (Hib), pneumokoki	Połączona szczepionka: DTaP/IPV/Hib i pneumokoki (PCV)
Trzy miesiące	Błonica, tężec, krztusiec, polio oraz pałeczki grypy typu b (Hib), zapalenie opon mózgowych C (meningokoki grupy C)	DTaP/IPV/Hib i MenC
Cztery miesiące	Błonica, tężec, krztusiec, polio oraz pałeczki grypy typu b (Hib), zapalenie opon mózgowych C Pneumokoki	DTaP/IPV/Hib, MenC oraz PCV
Około 12 miesięcy	Pałeczki grypy typu b (Hib) oraz zapalenie opon mózgowych C	Hib/MenC
Około 13 miesięcy	Odra, świnka oraz różyczka Pneumokoki	MMR i PCV
Trzy lata i cztery miesiące lub krótko później	Błonica, tężec, krztusiec oraz polio Odra, świnka oraz różyczka	DTaP/IPV lub dTaP/IPV i MMR
Dziewczynki w wieku od 12 do 13 lat	Rak szyjki macicy spowodowany przez ludzką odmianę papillomawirusa typu 16 i 18	HPV
Od 13 do 18 lat	Tężec, błonica oraz polio	Td/IPV

Nierutynowe szczepienia dla dzieci zagrożonych zachorowaniem

Wiek szczepienia	Choroby przeciwko którym chroni szczepienie	Podana szczepionka
Po urodzeniu (dla dzieci, które są narażone na kontakt z gruźlicą w większym	Gruźlica	BCG

stopniu niż reszta społeczeństwa)		
Po urodzeniu (dla dzieci, których matki chorują na zapalenie wątroby typu B)	Zapalenie wątroby typu B	Hep B